

# Áp dụng kháng sinh phá thai viên thứ 1 còn duy trì được con không?

Uống thuốc phá thai viên trước tiên còn giữ được con không? Đây là câu hỏi mà rất nhiều lần chị em phụ nữ để ý lúc phải đối mặt mang vấn đề bỏ thai bằng kháng sinh. Dưới đây sẽ tư vấn giúp bạn các điều cần thiết biết về cách bỏ thai bằng kháng sinh, phương pháp lấy thuốc kháng sinh bỏ thai an toàn và tác dụng tốt, cũng như là những tác dụng phụ và gây ra có thể xảy ra.

Dùng thuốc để phá thai hiện là cách được nhiều bà mẹ dùng do sự dễ dàng, tiện lợi và ít gây ra phiền toái. Tuy nhiên, bỏ thai bằng thuốc kháng sinh cũng không hề là biện pháp tuyệt vời, có những rủi ro và giảm thiểu mà bạn cần thiết chú ý. Sau đây sẽ trả lời giúp bạn dùng kháng sinh bỏ thai viên thứ 1 còn giữ được con không, cho bạn đưa ra quyết định có trách nhiệm và bảo vệ tính mệnh của bản thân.

## Phá thai bằng thuốc kháng sinh là gì?

Trước thời gian giải đáp thắc mắc sử dụng thuốc bỏ thai viên thứ 1 còn giữ được con không, bạn cần thiết hiểu rõ về biện pháp bỏ thai bằng thuốc là gì?



Đây là phương pháp sử dụng kháng sinh để chấm dứt thai kỳ 1 biện pháp được bảo vệ với điều kiện cần được tuân thủ dưới sự giám sát của bác sĩ y tế có chuyên khoa và kỹ năng cần phải. Để thực hành phá thai với kháng sinh, cần có sự thăm khám kỹ lưỡng, và biện pháp này chỉ áp dụng trong các trường hợp cụ thể mà cả đứa con và thai phụ đều thực hiện được những điều kiện nhất định. Đó là:

- Thai nhi dưới 7 tuần độ tuổi, đã nằm trong tử cung, kích thước không quá 2.3 cm.
- Thai phụ cần có tính mạng uy tín tốt và không gặp phải các căn bệnh mãn tính như không đủ máu, suy gan, suy thận và các bệnh giống.
- Bà mẹ không mắc những bệnh viêm phụ khoa; ví như có, cần phải được điều trị hoàn toàn trước thời điểm tiến hành phá thai bằng thuốc kháng sinh.

Bỏ thai với kháng sinh gồm có việc dùng hai loại thuốc kháng sinh là mifepristone và misoprostol. Mifepristone có chức năng chặn vận động của progesterone, hormone cần thiết trong việc giữ thai kỳ và tiến triển phôi. Khi không có progesterone, túi thai không còn bám đến niêm mạc tử cung, dẫn tới việc đứa bé ngừng tiến triển. Misoprostol sau ấy được dùng để gây ra co bóp tử cung, giúp đẩy phôi thai ra dứt điểm cơ thể.

## **Biện pháp dùng thuốc bỏ thai 1 giải pháp sử dụng các biện pháp an toàn và lợi ích tốt**

Để uống thuốc bỏ thai được bảo vệ là phải tuân theo chỉ dẫn và hướng dẫn của chuyên gia. Bạn không nên tự ý mua thuốc bỏ thai vừa rồi mạng thường ở các cửa hàng không rõ nguồn gốc, vì có thể gặp khả năng sắm nên hàng nhái, hàng giả, gây nên hiểm nguy cho tính mạng và sức khỏe của bạn.

[Mua thuốc phá thai ở đâu](#)

[Phá thai không đau ở Hà Nội](#)

[Chi phí phá thai an toàn](#)

[Phòng khám sản phụ khoa](#)

[Phụ khoa](#)

[Địa chỉ khám phụ khoa tốt ở Hà Nội](#)

[Bác sĩ tư vấn phụ khoa online](#)

[Bác sĩ khám phụ khoa giỏi ở Hà Nội](#)

[Tư vấn phụ nữ quan hệ nhiều có nhanh già không](#)

Phương pháp uống thuốc bỏ thai gồm có hai bước:

Bước 1: uống 1 viên mifepristone (200 mg) sử hữu một ly nước. Bạn cần thiết dùng thuốc kháng sinh này khoảng tầm 24 giờ sau lúc xét nghiệm và được chuyên gia kê đơn. Dưới lúc uống kháng sinh, bạn nên nghỉ ngơi tại cơ sở y tế tầm 1 giờ để chuyên gia theo dõi mức độ tim mạch, huyết áp và các biểu hiện mối liên quan. Trường hợp không có biến chứng gì diễn ra, bạn sẽ được giúp về nhà và tự theo dõi sức khỏe của chính mình.

Bước 2: sau 24 tới 48 giờ kể từ lúc uống viên thuốc kháng sinh đầu tiên, bạn sẽ uống bốn viên misoprostol (800 mcg) theo 1 trong hai phương pháp sau: đặt dưới lưỡi hay đặt lên vùng kín. Bạn nên dùng kháng sinh này tại cơ sở y tế để bác sĩ có khả năng giám sát quá trình phá thai và cung ứng sự hỗ trợ ví như nên. Sau thời gian lấy thuốc kháng sinh, bạn cần phải ở lại bệnh viện ít nhất hai giờ để bác sĩ kiểm tra xem phá thai từng hoàn tất thường chưa.

## **Các tác dụng phụ và hậu quả có khả năng tiếp diễn thời điểm áp dụng kháng sinh phá thai**

Thời điểm lấy kháng sinh bỏ thai, bạn có thể gặp một vài tác dụng phụ thí dụ sau:

Xuất huyết âm đạo: đây là tác dụng phụ thường gặp nhất thời điểm uống kháng sinh bỏ thai. Chảy máu bộ phận sinh dục có khả năng bắt đầu tức khắc sau khi sử dụng thuốc hay dưới một vài giờ. Số lượng huyết chảy có khả năng không giống nhau tùy theo đã đối tượng, song hay nhiều hơn so với kinh nguyệt bình luân. Ra huyết bộ phận sinh dục có khả năng kéo dài từ 1 tuần tới một tháng, tùy theo tuổi thai và cơ địa của bạn.

Đau bụng: đây là công dụng phụ thường diễn ra khi sử dụng viên thuốc kháng sinh thứ hai (misoprostol), vì thuốc kích thích ham muốn tử cung co bóp. Đau bụng có khả năng cải thiện từ một tới hai ngày và có thể suy nhược dần lúc phá thai hoàn tất. Bạn có khả năng dùng kháng sinh suy

yếu đau như là ibuprofen hoặc paracetamol để làm theo suy yếu cơn đau, tuy vậy không được sử dụng aspirin do có thể thực hiện tăng lượng huyết chảy.

Buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, sốt, ớn lạnh: đây là những tác động phụ khác có khả năng diễn ra thời gian dùng thuốc kháng sinh bỏ thai, song thường không quá nặng và sẽ tự khắc mất đi sau một số giờ hay một vài ngày. Bạn nên dùng rất nhiều lần nước và ăn nhẹ để giảm thiểu mất nước và dinh dưỡng. Trường hợp bạn có biểu hiện sốt cao hơn 38 độ c, cải thiện hơn một ngày, hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng đó là đau bụng dữ dội, xuất máu nhiều, xuất khí hôi, bạn cần phải đi khám bác sĩ liền.

## **Sử dụng thuốc phá thai viên đầu tiên còn giữ được con không?**

Áp dụng thuốc bỏ thai viên đầu tiên còn giữ được con không? Đây là vướng mắc mà nhiều phụ nữ muốn đổi thay quyết định phá thai sau khi lấy viên thuốc thứ 1 (mifepristone) luôn đặt chảy. Tuy nhiên, câu giải đáp cho vướng mắc này không đơn giản, bởi có nhiều nguyên do ảnh hưởng đến khả năng có thai tiếp tục sau thời điểm áp dụng thuốc kháng sinh bỏ thai.

Một tìm hiểu của cdc hoa kỳ năm 2012 chỉ ra rằng, có tầm 8% tình huống thai vẫn tiếp tục phát triển sau thời gian dùng thuốc phá thai. Mặc dù vậy, tỷ lệ này có khả năng đổi thay tùy theo độ tuổi thai, liều số lượng thuốc và thời gian uống kháng sinh. Cùng với xuất, việc uống kháng sinh bỏ thai cũng có khả năng tạo nên những hậu quả cho thai nhi như dị tật bẩm sinh, sảy thai, hay sinh non.

Vì vậy, trường hợp bạn quyết định giữ thai sau thời gian đã sử dụng thuốc kháng sinh phá thai, bạn cần phải ngay lập tức số điện thoại với bác sĩ để nhận được sự tư vấn và giúp đỡ kịp thời. Bác sĩ có khả năng kê đơn giúp bạn 1 loại thuốc không giống có tên là progesterone để nỗ lực ngăn chặn công dụng của mifepristone và giữ sự có thai.

Tuy nhiên, bạn cũng cần phải biết rằng việc này chẳng phải là một giải pháp chắc chắn và có khả năng không thành quả trong một số tình huống. Bạn cũng cần thực hành những kiểm tra và rất âm để xét nghiệm tình trạng của đứa bé và tử cung để đảm bảo sử dụng các biện pháp an toàn giúp sức khỏe của bạn và đứa bé.

# Lời khuyên cáo giúp phụ nữ sau khi bỏ thai bằng thuốc

Sau thời gian bỏ thai với kháng sinh, chị em cần chú ý tới các điều sau:

- Kiên quan hệ tầm khoảng 2 tuần để tránh viêm và có bầu lại.
- Kiên tắm bồn, bơi lội, xông tương đối, nặn nhọt, uống rượu, bia, cà phê, thuốc lá, hoạt chất kích thích tầm khoảng 2 tuần.
- Ăn lấy gần như, cân bằng, bổ sung vitamin và sắt để phục hồi tính mệnh và khôi phục kinh nguyệt.
- Dùng những cách ngừa thai an toàn và hiệu quả để hạn chế bắt buộc bỏ thai lặp lại.
- Đi kiểm tra sức khỏe định kỳ và theo dõi các dấu hiệu bất thường thí dụ sốt cao, đau đởn bụng dữ dội, xuất máu nhiều, mùi hôi, sưng vú, đào thải sữa.

Bài viết vừa rồi của chúng tôi từng phần nào cho bạn trả lời nghi vấn lấy thuốc bỏ thai viên đầu tiên còn duy trì được con không cộng những vấn đề mối quan hệ thời gian bỏ thai với kháng sinh.

Bỏ thai với thuốc kháng sinh là 1 phương pháp phá thai sử dụng các biện pháp an toàn và hiệu quả lúc được làm đúng cách và dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. Tuy vậy, bạn cũng cần thiết cân kể kỹ trước lúc quyết định phá thai bằng thuốc, bởi cách này có khả năng tạo nên những tác dụng phụ và gây ra không mong muốn.

Nếu bạn muốn biến đổi quyết định phá thai dưới khi uống thuốc kháng sinh, bạn cần thiết đường dây nóng sở hữu chuyên gia ngay lập tức để được trả lời và hỗ trợ. Bạn cũng cần chú ý tới sức khỏe của mình và đứa con và tuân thủ các cách phòng tránh thai kỳ không đòi hỏi trong tương lai.